



Bollettino settimanale del CENTRO OPERATIVO PER LA LOTTA ALLE ZANZARE

BIELLESE ED ALTO VERCELLESE

R.T.S. dott. Bruciaferri Davide tel. 348/3018155 e-mail: zanzare.biellese@gmail.com

Periodo di riferimento: 01-07 luglio 2019

Livelli medi d'infestazione dei focolai di sviluppo larvale

	Nulla/molto basso (0-5 larve/½ l)	Basso (da 5 a 10 larve/½ l)	Medio (da 10 a 20 larve/½ l)	Elevato (da 20 a 50 larve/½ l)	Molto elevato (>50 larve/½ l)
Caditoie ("spie")				✓	
Focolai naturali				✓	

Dati medi monitoraggio alate (Tot. Stazioni: 20)

Andamento catture (n° medio/trappola/notte)	N° massimo catture	N° minimo catture
<p>Stazione di Strona: 750</p>		Stazione di Borriana, Verrone e Arborio: 0 Stazioni di Viverone, Muzzano, Sostegno, Cavaglià < 10 esemplari

Trattamenti nei Comuni dal 01/07/19 al 07/07/19

Comune	Adulticidi (Prodotto utilizzato: piretroidi)	Larvicidi Biologici Codici focolai trattati (Prodotto utilizzato <i>Bacillus Thuringiensis var. israelensis</i>)
Sandigliano		1B011SN, 1B002SN, 1B005SN, 1B006SN
Benna		4B001BE, 4B014BE
Masserano		4A027MS, 4A019MS, 4A029MS, 4A027MS
Verrone		4B005VE
Buronzo		4A004BU, 4A009BU, 4A010BU
Lenta		4A009LE, 4A024LE, 4A019LE, 4A021LE
Roasio		3B001RO, 3B006RO, 3B013RO, 3B014RO, 3B015RO, 3B016RO, 3B002RO, 3B003RO, 3B007RO, 3B005RO
Villa del Bosco		3B00VB
Pray		3B001PY
Ponderano		1B025PN, 1B016PN, 1B017PN, 1B023PN, 1B024PN
Muzzano		1B001MU, 1B008MU, 1B009MU
Greggio		4A001GE, 4A002GE, 4A003GE, 4A004GE, 4A005GE, 4A006GE, 4A007GE, 4A008GE
Sordevolo	✓ (05/07/19)	
Vigliano		2001VI, 2002VI, 2003VI, 2004VI, 2005VI, 2006VI
Piatto		2003PI
Zimone		1A001ZI
Massazza		4B001MA, 4B003MA
Dorzano		4B001DZ, 4B003DZ
Cavaglià		4B018CV, 4B020CV
Palazzo		1A001PA, 1A002PA, 1A003PA, 1A004PA, 1A007PA, 1A019PA
Roppolo		1A001RP, 1A002RP
Piverone		1APV010, 1A011PV, 1A015PV, 1A020PV
Viverone		1A004VV, 1A005VV, 1A002VV, 1A001VV, 1A06VV, 2A003VV

Trattamento tombini pubblici (prodotto utilizzato: Diflubenzuron)

Comuni oggetto di trattamento: Muzzano, Cerreto Castello, Greggio, Masserano, Pray, Quaregna, Roasio, Rovasenda, Torrazzo, Verrone

Previsioni e consigli per limitare il livello di molestia

Con la settimana scorsa siamo entrati nel periodo centrale per la presenza delle zanzare. Le trappole per il monitoraggio degli adulti cominciano a presentare i picchi più alti della stagione; nella settimana di riferimento, a parte in un paio di casi (trappole di Strona e Gattinara), i livelli di cattura si attestano sotto i 280 esemplari/notte, con ancora quattro casi al di sotto dei 10 esemplari e tre con catture nulle. La specie prevalente è *Ochlerotatus caspius* ("zanzara di risaia") fortemente legata alle oscillazioni idriche dei suoi tipici focolai, rappresentati da risaie ed aree umide dei terreni impermeabili, come quelli di Baraggia. Questi ultimi, grazie alle piogge brevi ma abbondanti dei temporali estivi come quelli verificatisi nei giorni scorsi, sono in grado di permettere la schiusa contemporanea di numerosissime larve. Giocano inoltre a favore le alte temperature e i venti dominanti che favoriscono lo spostamento in massa di numerosi esemplari adulti della specie. Sono anche in aumento le altre specie fra cui *Culex pipiens* e *Aedes albopictus* (z. tigre) tipiche dei centri urbani per le quali diventa fondamentale il controllo in ambito privato (giardini, terrazze, orti) oltre a quello effettuato dal nostro Centro Operativo a carico delle tombinature pubbliche che con la settimana in corso vedrà terminato il primo turno su tutti i 59 Comuni aderenti al progetto. Continuano anche i trattamenti "preventivi" effettuati dal nostro Centro Operativo, che la scorsa settimana hanno interessato un'ottantina di siti naturali infestati. Si invita la popolazione a prestare molta attenzione alla gestione dei sottovasi (con svuotamento frequente) ed a quella dei bidoni per l'irrigazione degli orti (con chiusura ermetica mediante reti zanzariere). Nella settimana in corso sono previsti trattamenti adulticidi nei seguenti Comuni: Gaglianico, Casapinta, Mottalciata, Albano, Benna, Castelletto Cervo.